

# Riesgo de Fracturas




MUJER  
SALUDABLE  
¡SIEMPRE!

La **osteoporosis** es una enfermedad poco diagnosticada y tratada, normalmente esto sucede hasta que existen múltiples fracturas, teniendo como consecuencia un grave problema de morbilidad y mortalidad a largo plazo.



**2 años** antes  
de fracturarse



**1 año** después  
de fracturarse



ifa  
CELTICS<sup>®</sup>  
en apoyo por la vida

Salud Femenina




MUJER  
SALUDABLE  
¡SIEMPRE!

El **38%** de los pacientes con fractura vertebral tuvieron otra fractura por fragilidad dentro de los 2 primeros años posteriores a la fractura vertebral. La mayoría de los pacientes con refractura (74%) tuvieron una o más fracturas



**30.6%**  
Vertebra



#### Referencia:

Barton DW, Behrend CJ, Carmouche JJ. Rates of osteoporosis screening and treatment following vertebral fracture. The Spine Journal. 2019;19:411-7

## En Osteoporosis y cáncer de mama

- **Eilen® (SERM)\* efecto agonista en hueso y antagonista en mama.<sup>1</sup>**
- **Eficaz en la prevención de fracturas vertebrales en mujeres postmenopáusicas.<sup>2</sup>**
- **Aumenta DMO (Densidad Mineral Ósea) en cuello femoral y columna.<sup>2</sup>**
- **Reduce el riesgo de cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas.<sup>3</sup>**
- **Menos efectos secundarios<sup>4</sup> y mejora la calidad de vida.<sup>5</sup>**

Tratamiento farmacológico con  
*mejor costo-beneficio*

**Eilen®**  
Raloxifeno

*Detenga el efecto dominó*



Reg. No. 040/M2018 SSAV

#### Dosis

1 tableta (60 mg) al día por vía oral; se puede administrar a cualquier hora del día, sin depender de las comidas.

\* SERM (siglas en inglés para: Modulador Selectivo de Receptores Estrogénicos)

1. Ki-Chan A. Selective estrogen receptor modulators. Asian Spine J 2016; 10:787-91. 2. Ettinger B, Black DM, Mitlak BH, et al for the MORE investigators. Reduction of vertebral fracture risk in postmenopausal women with osteoporosis treated with raloxifene. JAMA 1999; 282: 637-46 3. Cummings SR, Eckert S, Krueger KA, et al. The effect of raloxifene on risk of breast cancer in postmenopausal women. Results from the MORE randomized trial. JAMA 1999; 281:2189-97. 4. Watson S, Pendick D. Osteoporosis: A guide to prevention and treatment. Harvard Medical School 2016 5. Yoh K, Hamaya E, Urushihara H, et al. Quality of life in raloxifene-treated Japanese women with postmenopausal osteoporosis: a prospective, postmarketing observational study. Curr Med Res Opin 2012; 28:1757-66.